


# 0 至 2 岁婴儿的耳部感染（中耳炎）：护理说明

## Ear Infection (Otitis Media) in Babies 0 to 2 Years: Care Instructions

### 您的护理说明



© Healthwise, Incorporated

耳部感染可能始于感冒，并累及中耳。这称为中耳炎。这会很疼痛。耳部感染的儿童通常哭闹不停，抓扯耳朵，难以入睡。

耳部感染在婴幼儿中更常见。

医生可能会开具抗生素处方治疗耳部感染。6个月以下的婴儿通常给予抗生素药物。如果您的孩子超过6个月，并且症状轻微，则可能不需要抗生素。您的医生还可能会建议用药物帮助缓解发烧或疼痛。

后续护理是您孩子治疗和保障安全的关键。确保去预约诊疗时间并接受所有诊疗，如果您的孩子出现任何问题，请打电话给医生进行咨询。最好了解一下孩子的检查结果，并保留一份所服用药物的清单。

### 如何在家为孩子进行护理？

- 如果孩子发烧、疼痛或烦躁，请给他们服用醋氨酚 (Tylenol) 或布洛芬 (Advil、Motrin)。请

务必安全用药。应认真阅读并按照标签上的说明服用。如果您的孩子不足 3 个月，未咨询医生前请勿给予任何药物。

- 如果医生给孩子开具抗生素处方，请遵照医嘱给孩子服用。不能因为孩子感觉好转就让孩子停止服药。孩子需要完成抗生素治疗全过程。
- 将热毛巾放在孩子耳朵上止痛。
- 试着让您的孩子安静休息。休息有助于身体对抗感染。

## 何时应打电话寻求医疗救护？

任何时候如果您认为需要紧急救护，请呼叫 911。例如，应在出现以下情况时打电话：

- 孩子看上去非常困或者不易唤醒。

如果出现以下情况，现在立即致电您的医生或立即寻求医疗护理：

- 孩子病情加重。
- 孩子新出现发烧或发烧温度升高。
- 孩子耳痛加重。
- 孩子耳周或耳背发红或肿胀。

密切关注孩子健康状况的变化，如果出现以下情况，请务必与医生联系：

- 孩子耳中新流出分泌物或分泌物增多。
- 两天（48 小时）后孩子症状未见好转。
- 孩子出现新症状，例如耳部感染治愈后出现听力问题。

## 您可从何处了解更多信息？

转至 <https://kp.org/health>

在搜索框中输入 V807，以了解更多信息“0 至 2 岁婴儿的耳部感染（中耳炎）：护理说明。”